

Kajian Kandungan Proksimat Udang Vaname (*Litopenaeus* *Vannamei*) Dari Berbagai Pemberian Probiotik (1).

by Open Turnitin 2

Submission date: 15-Jan-2024 04:46AM (UTC-0800)

Submission ID: 2269347205

File name: me_*Litopenaeus_Vannamei_Dari_Berbagai_Pemberian_Probiotik_1.pdf* (322.83K)

Word count: 3815

Character count: 23111

Kajian kandungan proksimat udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) dari berbagai pemberian probiotik

Study of the proximate ingredients of vaname shrimp (*Litopenaeus vannamei*) from various probiotic treatments

Fahmi Yudas Bastian¹⁾, Lukman Hudi^{1*)}, Ida Agustini Saidi¹⁾, Rahmah Utami Budiandari¹⁾

¹Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

* Email Korespondensi: lukmanhudi@umsida.ac.id

5

Abstract. Vaname shrimp is one type of shrimp that has high nutritional value and fast growth. In this study in vaname shrimp cultivation using intensive methods and the addition of probiotics in each treatment. The purpose of the study was to determine the effect of probiotics on the proximate content of vaname shrimp (*Litopenaeus vannamei*). The design used is CRD (Completely Randomized Design) with treatments including P1: conventional cultivation (without probiotics), P2: Probiotic Bio Lacto, P3: Tricodherma sp, P4: GSO4 Probiotic, P5: Tricodherma sp + Probiotic GSO4, and P6: Tricodherma sp + Probiotic Bio Lacto which was done 3 times. Data were analyzed using ANOVA followed by BNJ 5 %. The results showed that giving probiotics to vaname shrimp only significantly affected the fat content, while it had no significant effect on water content, ash content, protein and carbohydrate content. The results of the data obtained on the fat content of the lowest value in the treatment of probiotics GSO4 with a value of $1.16 \pm 0.14\%$, and the highest value in the treatment of probiotics Bio Lacto with a value of $4.18 \pm 0.76\%$. The fat content of vaname shrimp has different values ranging from the lowest to the highest value influenced by the provision of different probiotics in each treatment.

Keywords: *Litopenaeus vannamei*, probiotics, proximate

Abstrak. Udang vaname adalah salah satu jenis udang yang memiliki nilai gizi tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Pada penelitian ini dalam budidaya udang vaname yakni menggunakan metode intensif serta penambahan probiotik pada setiap perlakuan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik terhadap kandungan proksimat udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). Rancangan yang digunakan yakni RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan perlakuan meliputi P1: budidaya konvensional (tanpa probiotik), P2: Probiotik Bio Lacto, P3: Tricodherma sp, P4: Probiotik GSO4, P5: Tricodherma sp + Probiotik GSO4, dan P6: Tricodherma sp + Probiotik Bio Lacto yang dilakukan 3 kali ulangan. Data dianalisa menggunakan ANOVA dilanjutkan BNJ 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik kepada udang vaname hanya berpengaruh nyata terhadap kandungan kadar lemak, sedangkan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar protein dan karbohidrat. Hasil data yang didapatkan pada kadar lemak nilai terendah pada perlakuan probiotik GSO4 dengan nilai $1,16 \pm 0,14\%$, dan nilai tertinggi pada perlakuan probiotik Bio Lacto dengan nilai sebesar $4,18 \pm 0,76\%$. Kandungan lemak pada udang vaname memiliki nilai yang berbeda mulai dari nilai terendah hingga tertinggi dipengaruhi oleh pemberian probiotik berbeda setiap perlakuananya.

Kata kunci: *Litopenaeus vannamei*, probiotik, proksimat

PENDAHULUAN

Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) secara alamiah menyebar di sepanjang pantai Pasifik Amerika Tengah dan Amerika Selatan (Fu and Liu, 2022). Karena banyak kelebihannya, udang vaname menjadi populer dalam budidaya tambak. Diantara kelebihan-kelebihannya adalah kemampuan pertumbuhan yang cepat, ketahanan terhadap salinitas rendah, dan resistensi

terhadap penyakit (BPBAP Situbondo, 2021.). Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) adalah salah satu jenis udang yang memiliki nilai gizi tinggi dan pertumbuhan yang cepat (Pawenang *et al.*, 2022).

Budidaya udang vaname di Indonesia melibatkan berbagai pola dan sistem budidaya yang beragam. Mulai dari metode tradisional hingga super intensif yang memanfaatkan beragam teknologi (Febriyani *et al.*, 2022). Saat ini, sebagian besar upaya pengembangan budidaya mengadopsi sistem pemeliharaan intensif di kolam, yang ditandai dengan peningkatan tingkat kepadatan populasi udang, pemberian pakan tambahan yang optimal, dan seringkali minim atau bahkan tidak ada pergantian air (Soedibya dan Pramono, 2018). Menurut penelitian Mariyani dan Hendriana (2021), menyatakan bahwa kualitas daging udang sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti konsumsi pakan dan kondisi lingkungan budidaya yang baik, yang menghasilkan daging udang yang lezat dengan kandungan gizi yang tinggi. Di sisi lain, penggunaan bakteri probiotik semakin berkembang dalam upaya untuk meningkatkan nutrisi, menjaga kesehatan pencernaan, dan mencegah penyakit dalam budidaya udang dan hewan air lainnya di berbagai negara berkembang (Jamal *et al.*, 2019).

Menurut Mustafa *et al.* (2019), penambahan probiotik dalam penerapan budidaya memiliki sejumlah manfaat yang mencakup pengendalian patogen pada inang dan dalam lingkungan budidaya, merangsang sistem kekebalan udang, serta meningkatkan kualitas air. Selain berperan dalam menjaga dan mengendalikan patogen dalam lingkungan budidaya, probiotik juga dapat memainkan peran penting dalam mengatur populasi bakteri patogen di saluran pencernaan. Salah satu manfaat probiotik yakni menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam sistem pencernaan dan menghambat pertumbuhan patogen didalamnya, sambil juga menghasilkan enzim yang mendukung pencernaan makanan (Dewi, 2023).

Kenaikan dalam pencernaan menandakan bahwa semakin banyak nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Namun, dalam penambahan probiotik atau zat aditif pada tambak budidaya udang dianggap dapat meningkatkan kualitas air dan meningkatkan perkembangan mikroorganisme patogen, yang menghasilkan kondisi tambak yang sehat dan lestari (Husaeni dan I Ketut Agus Sudarmayasa, 2018).

1 Sejumlah penelitian yang mencakup studi oleh Burhanuddin *et al.* (2016) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Setyono *et al.* (2019) telah menjelaskan bahwa penggunaan probiotik dalam budidaya udang vaname memiliki efek yang menguntungkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang vaname.

Dalam studi yang dilakukan oleh Verdian *et al.* (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air pada udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) adalah sekitar 72,64 %, sementara udang windu (*Penaeus monodon*) memiliki kadar air sekitar 73,39 %. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan serat kasar antara kedua jenis udang ini. Namun, kadar abu dalam udang windu lebih tinggi, yaitu sekitar 6,25%, dibandingkan dengan udang vaname yang memiliki kadar abu sekitar 3,90%.

Begini pula, Ikbal Syukroni dan Andi Santi (2021) menyajikan data mengenai kandungan udang windu segar, yang meliputi kadar air sekitar 72,59 %, kadar abu sekitar 3,43 %, kadar protein sekitar 20,09%, dan kadar lemak sekitar 2,68 %. Sebaliknya, dalam analisis yang dilakukan oleh Li *et al.*, (2021) pada udang vaname, kandungan protein kasar berkisar antara 21,1 % hingga 22,3 %, kandungan lemak kasar berkisar antara 0,8% hingga 1,1 %, dan kadar abu berkisar antara 1,6 % hingga 1,7 %.

Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai kadar abu antara kedua jenis udang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengetahui bagaimana dampak pemberian berbagai jenis probiotik kepada udang vaname terhadap komposisi proksimatnya. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang potensi penggunaan probiotik dalam memengaruhi komposisi proksimat udang vaname.

METODE

Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) segar dari berbagai perlakuan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) meliputi P1: Budidaya konvensional (tanpa probiotik), P2: Probiotik *Bio lacto*, P3: *Tricodherma sp*, P4: Probiotik GSO4, P5: *Tricodherma sp* + Probiotik GSO4, P6: *Tricodherma sp* + Probiotik *Bio lacto* sehingga didapatkan 6 perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 18 satuan percobaan.

Probiotik *Bio Lacto* adalah probiotik komersial dalam bentuk cair yang memiliki kandungan *Lactobacillus Bulgaricus*, *Lactobacillus casei* dan Carrier. Probiotik *Tricodherma sp*. yaitu berupa fungi yang didapatkan dari Lab. Mikrobiologi Tanaman prodi Agroteknologi Umsida. Probiotik GSO4 adalah probiotik komersial yang bermerek "Golden Soil New" berbentuk cair memiliki kandungan *Lactobacillus*, *Azotobacter*, *Acetobacter*, dan *Yeast*.

Bahan

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah udang vaname segar hasil budidaya dari berbagai perlakuan, sedangkan bahan analisa kimia meliputi H₂SO₄, Tablet Kjedhal, Aquades, NaOH, HCL, Indikator Metil Merah, Petroleum Eter, Pakan komersial meliputi *Bio Lacto*, GSO4 dan *Trichoderma sp*.

Alat

Alat yang digunakan untuk meliputi Timbangan Analitik merk Ohaus, Spatula, Mortar dan Alu, Arloji, Labu Kjedahl, Kompor Listrik, Lemari Asam, Bunsen, Pipet Tetes, Kondesor, Erlenmeyer merk Pyrex, Corong, Buret, Beker Gelas merk pyrex, Statif, Satu set alat destilasi, Gelas Ukur merk Pyrex Pipet Volum merk Pyrex, Kertas saring, Kapas Wool, Labu Lemak merk duran, Soxhlet, Selang, Pompa Air, Oven Listrik merk Memmert, Desikator, Penjepit Krusible, Krus, Cawan Petri, Tanur.

Tahapan pelaksanaan

Penelitian dilakukan mulai dari bulan September hingga bulan Desember 2022. Pengambilan sampel di tempat pembudidayaan udang vaname konvesional dan intensif di Tlocor, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo. Sedangkan, analisa proksimat dilakukan di Laboratorium Analisa Pangan, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Prosedur penelitian

1. Probiotik *Bio Lacto*

Probiotik *Bio Lacto* dilakukan pengambilan sebanyak 100 mL, lalu dilakukan pengkulturan dengan gula 500 gram, susu skim 500 gram dan aquades sebanyak 5 liter. Bahan – bahan tersebut dilakukan pengadukan secara perlahan hingga homogen. Setelah homogen dilakukan inkubasi selama ± 24 jam. Pemberian probiotik dilakukan seminggu sekali pada setiap perlakuan kolam.

2. Probiotik *Trichoderma sp*

Langkah awal yakni pembuatan media PDA-c (Potato Dextrose Agar-chloramphenicol) yang dituangkan dalam cawan petri untuk menumbuhkan mikroba dalam kandungan tanah. Selanjutnya, pencuplikan 2 gram sampel tanah dan diencerkan sebanyak 10⁻⁴ pada beaker gelas 100 mL dengan tiap pengenceran dilakukan perataan menggunakan *magnetic stirrer* hingga homogen. Lalu cairan sebanyak 1 mL diambil menggunakan syringe dan disemprotkan dalam cawan petri, kemudian dilakukan inkubasi selama 3 hari. Lalu penginokulasi ke permukaan media PDA-c dengan jarum ose, kemudian inkubasi selama 7 – 10 hari. Setelah penginkubasi dan pemindahan inoculum, koloni tersebut

memenuhi permukaan media dalam cawan petri. Selanjutnya pemberian probiotik dilakukan seminggu sekali pada setiap perlakuan kolam.

3. Probiotik GSO4

Pengambilan probiotik GSO4 komersil sebanyak 100 ml dan ditambahkan 5 liter aquades lalu diaduk hingga homogen. Setelah homogen dilakukan inkubasi \pm 24 jam. Pemberian probiotik dilakukan seminggu sekali pada setiap perlakuan kolam.

4. Prosedur penelitian pasca panen

Panen udang vaname pada umur 42 hari. Pengambilan sampel udang vaname segar diambil dari berbagai perlakuan pada kolam. Lalu dilakukan penyimpanan dalam suhu beku. Udang dicairkan terlebih dahulu. Setelah cair sampel udang dilakukan penghalusan dengan alat mortar. Sampel yang halus dilakukan analisa.

Variable yang diamati

Hal -hal yang diamati pada penelitian ini meliputi:

1. Analisa proksimat:

- Protein metode kjedhal (Sudarmadji, 1997)
- Kadar lemak metode soxhlet (Santoso Umar, 2020)
- Kadar air metode oven kering (AOAC, 2007)
- Kadar abu metode oven kering (AOAC, 2007)

2. Analisa Karbohidrat by Difference (Sudarmadji dkk, 1989)

Analisa data

Hasil data dianalisis melalui metode ANOVA dan apabila hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji BNJ (Berbeda Nyata Jujur) dengan tingkat kepercayaan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar air

Kandungan air adalah salah satu komposisi bahan makanan yang memengaruhi tampilan, tekstur, dan rasa makanan (Rahman *et al.*, 2018). Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian berbagai probiotik tidak berbeda nyata terhadap kadar air kandungan udang vaname. Tabel 1 menunjukkan nilai kadar air terendah dengan nilai rata-rata $76,65 \pm 0,73$ % diperoleh pada perlakuan pemberian *Tricodherma sp* + Probiotik GSO4 (P5) sedangkan nilai kadar air tertinggi dengan nilai rata-rata $78,43 \pm 0,81$ % diperoleh pada perlakuan pemberian probiotik GSO4 (P4).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Olivia Akaerina *et al.* (2015), dinyatakan bahwa kandungan air memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas bahan makanan selama proses pengolahan. Air juga diperlukan untuk penyimpanan makanan, dan ketika kandungan air dalam makanan tinggi, hal ini dapat mengakibatkan proses biologis internal yang lebih cepat, serta meningkatkan risiko pertumbuhan mikroba berbahaya. Mikroorganisme membutuhkan kelembaban untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mereka.

Kadar abu

Kandungan abu adalah hasil penimbunan mineral dan komponen anorganik dari suatu bahan pangan, termasuk dalam hal ini, udang vaname (Sudjarwo *et al.*, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian berbagai probiotik tidak berbeda nyata terhadap kadar abu kandungan udang vaname. Tabel 1 menunjukkan nilai kadar abu terendah dengan nilai rata-rata $1,37 \pm 0,08$ % diperoleh pada perlakuan probiotik GSO4 (P4) sedangkan nilai kadar abu tertinggi dengan nilai rata-rata $1,49 \pm 0,23$ % diperoleh pada perlakuan pemberian *Tricodherma sp* + *Bio Lacto* (P6).

Kandungan abu bisa berfungsi sebagai petunjuk mengenai jumlah mineral yang terkandung dalam sampel. Perbedaan nilai kandungan abu terkait dengan perbedaan kondisi lingkungan dan praktik budidaya. Menurut Agus dan Bambang (2018) menyatakan bahwa, hewan krustasea, termasuk udang, membutuhkan mineral penting untuk mendukung metabolisme dasar dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain mendapatkan mineral ini melalui makanan, udang juga aktif mengambil sumber mineral dari lingkungan air.

Lemak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian berbagai probiotik berbeda nyata terhadap kandungan lemak udang vaname. Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar lemak tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian *Bio Lacto* (P2) yang menunjukkan rata –rata kadar lemak udang vaname yaitu $4,18 \pm 0,76\%$, meskipun tidak berbeda nyata dengan perlakuan budidaya konvesional (P1) dengan rata –rata kadar lemak $2,22 \pm 1,54\%$, namun berbeda nyata dengan perlakuan pemberian Probiotik *Bio Lacto* (P2) dengan rata – rata kadar lemak $4,18 \pm 0,76\%$. Sedangkan kandungan kadar lemak terendah diperoleh pada perlakuan pemberian probiotik GSO4 (P4) dengan rata –rata kadar lemak $1,16 \pm 0,14\%$.

Kandungan lemak yang rendah pada udang dari berbagai percobaan diduga disebabkan oleh keseimbangan antara protein dan non-protein dalam pakan yang diberikan, yang sesuai dengan kebutuhan udang (Lestari *et al.*, 2019). Temuan yang serupa dicatat oleh Lestari *et al.*, yang menyebutkan pakan pada ikan memiliki proporsi yang cukup baik antara protein dan komponen non-protein untuk memenuhi kebutuhan ikan, sehingga lemak dapat digunakan dengan efisien sebagai sumber energi. Oleh, karena itu, jumlah lemak yang terakumulasi dalam tubuh udang tidak hanya dipengaruhi oleh jenis udang, tetapi juga oleh kebiasaan makanan, jenis pakan, usia, dan musim (Ngon *et al.*, dalam Wicaksana dan Rachman 2018).

Lemak yang diserap melalui proses pencernaan digunakan oleh udang eksperimen sebagai sumber energi dan untuk proses metabolisme lainnya. Lipid yang tersimpan akan didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan selama periode tertentu, seperti selama stadia premolt (Agustono *et al.*, 2015).

Tabel 1. Hasil uji analisa kandungan proksimat udang vaname

Perlakuan	Analisa Proksimat				
	Kadar Air (%)	Kadar Abu (%)	Protein (%)	Lemak (%)	Karbohidrat by difference (%)
P1 Budidaya Konvesional	$77,12 \pm 1,42$	$1,42 \pm 0,25$	$15,12 \pm 0,27$	$2,22 \pm 1,54^{ab}$	$4,11 \pm 3,24$
P2 Probiotik <i>Bio Lacto</i>	$77,72 \pm 0,06$	$1,40 \pm 0,01$	$11,94 \pm 0,26$	$4,18 \pm 0,76^b$	$4,76 \pm 0,96$
P3 <i>Tricodherma sp</i>	$77,39 \pm 1,00$	$1,41 \pm 0,05$	$13,85 \pm 0,82$	$1,18 \pm 0,47^a$	$6,16 \pm 1,39$
P4 Probiotik GSO4	$78,43 \pm 0,81$	$1,37 \pm 0,08$	$14,98 \pm 2,91$	$1,16 \pm 0,14^a$	$4,07 \pm 2,15$
P5 <i>Tricodherma sp</i> + Probiotik GSO4	$76,65 \pm 0,73$	$1,43 \pm 0,17$	$14,38 \pm 0,64$	$1,66 \pm 0,07^a$	$5,88 \pm 1,47$
P6 <i>Tricoderma</i>	$77,73 \pm 1,00$	$1,49 \pm 0,23$	$12,59 \pm 0,09$	$2,90 \pm 0,18^{ab}$	$5,31 \pm 0,92$

sp + Probiotik
Bio Lacto

BNJ 5%	tn	tn	tn	2,01	tn
Ket: Angka – angka dalam kolom yang identik dengan penanda huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan ($\alpha: 0,05\%$).					

Protein

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian berbagai probiotik tidak berbeda nyata terhadap kandungan protein udang vaname. Tabel 1 menunjukkan nilai protein terendah dengan nilai rata-rata $11,94 \pm 0,26\%$ diperoleh pada perlakuan probiotik *Bio Lacto* (P2) sedangkan nilai protein dengan nilai rata-rata $15,12 \pm 0,27\%$ diperoleh pada perlakuan budidaya konvesional (P1).

Protein yang terakumulasi dalam tubuh udang dan dibandingkan dengan protein dalam makanan yang dikonsumsi disebut sebagai retensi protein. Faktor-faktor yang memengaruhi retensi protein termasuk kandungan protein dalam makanan, total energi yang tersedia dalam makanan, dan kualitas proteinnya (Masfirotun *et al.*, 2021). Hasil penelitian oleh Dahlia *et al* (2019) menunjukkan bahwa penambahan bakteri probiotik mampu meningkatkan kemampuan udang vaname untuk mempertahankan proteinnya, sementara tambahan nutrisi dari pakan yang digunakan dalam sistem budidaya dan sisa-sisa yang terbentuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan udang vaname. Dalam penelitian Kurniawan *et al.* (2019), disebutkan bahwa retensi protein yang disuplai kepada udang dapat diserap dan digunakan untuk memulihkan sel-sel tubuh yang mungkin mengalami kerusakan, serta untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Nilai retensi protein dihitung dengan membandingkan jumlah protein yang disimpan dalam jaringan tubuh udang dengan jumlah protein dalam pakan yang dikonsumsi.

Karbohidrat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian *Tricodherma sp* (P3) yang menunjukkan rata – rata karbohidrat udang vaname yaitu $6,16 \pm 1,39\%$. Namun, tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan kandungan karbohidrat terendah diperoleh pada perlakuan pemberian probiotik GSO4 (P4) yang menunjukkan rata – rata karbohidrat udang vaname yaitu $4,07 \pm 2,15\%$.

Sejumlah studi telah mengindikasikan bahwa meningkatnya konsumsi karbohidrat dapat mengurangi penimbunan lemak dalam tubuh. Ada kemungkinan untuk menemukan aktivitas penghambatan berbagai jenis asam amino terhadap berbagai jenis monosakarida dan sebaliknya (Of. E, 2015). Salah satu kemampuan terbatas udang terdapat pada manfaat karbohidrat namun tidak bisa beradaptasi dengan level tinggi karbohidratnya (Wibowo *et al.*, 2023). Namun, dalam pakan buatan untuk kruatasea merupakan sumber energi dalam mekanisme *protein – sparing effect* yang terdapat pada komponen karbohidrat (Zainuddin *et al.*, 2018)

KESIMPULAN


Disimpulkan bahwa hasil dan pembahasan yang diatas menyatakan bahwa perlakuan berpengaruh nyata hanya terhadap dikandungan kadar lemak, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar protein dan karbohidrat. Pada kadar lemak nilai terendah pada perlakuan probiotik GSO4 dengan nilai $1,16 \pm 0,14\%$, dan nilai tertinggi pada perlakuan *Bio Lacto* dengan nilai sebesar $4,18 \pm 0,76\%$. Sehingga kandungan lemak pada udang vaname memiliki nilai yang berbeda mulai dari nilai terendah hingga tertinggi dipengaruhi oleh pemberian probiotik berbeda setiap perlakuan.

Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian dalam Program Riset Mahasiswa Kampus Merdeka dan Matching Fund DIKTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiono, Bambang Widigdo, dan K. S. (2018). Effect of mineral composition of inland saline groundwater. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(3), 535–546.
- Agustono, A., Lokapirnasari, W. P., & Riyadh, A. (2015). Pengaruh penambahan crude fish oil (CFO) pada pakan udang vaname (*Litopenaeus Vannamei*) terhadap kandungan kolesterol dan retensi lemak daging [Influence of addition crude fish oil (CFO) in white shrimp (*Litopenaeus Vannamei*) feed to cholesterol content and fat retention in Meat]. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 7(1), 95-100.
- AOAC. 2007. Official methods of analysis. Assosiation of official chemist. Inc.
- BPBAP Situbondo. 2021. Klaster budidaya udang vaname generasi milenial. Situbondo
- Burhanuddin, Wahyu, F., Suratman. 2016. Aplikasi probiotik dengan konsentrasi berbeda terhadap pertumbuhan udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Octopus Jurnal Ilmu Perikanan*. 5(1); 462-465.
- Dahlan, J., Hamzah, M., & Kurnia, A. (2019). Pertumbuhan udang vaname (*litopenaeus vannamei*) yang dikultur pada sistem bioflok dengan penambahan probiotik. *JSIPI (Jurnal Sains Dan Inovasi Perikanan) (Journal of Fishery Science and Innovation)*, 1(2), 19–27. <https://doi.org/10.33772/jsipi.v1i2.6591>
- Dewi, I. C., Subaryanto, S., & Ernawati, E. (2023). Pengaruh pemberian probiotik lactobacillus sp. Dan bacillus sp. Dengan dosis yang berbeda pada media pemeliharaan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Nekton*, 37-50.
- Febriyani, R., Musa, M., & Mahmudi, M. (2022). Analysis of the relationship of water quality to total hemocytes in intensive ponds for vannamei shrimp (*Litopenaeus vannamei*) cultivation CV TTB, Pasuruan City, East Java. *Depik*, 11(2), 252–256. <https://doi.org/10.13170/depik.11.2.24747>
- Fu, S., & Liu, J. (2022). Genome-wide association study identified genes associated with ammonia nitrogen tolerance in *Litopenaeus vannamei*. *Frontiers in Genetics*, 13(August), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fgene.2022.961009>.
- Husaeni dan, & I Ketut Agus Sudarmayasa. (2018). Pemberian probiotik pada budidaya udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) semi intensif di tambak. *Buletin Teknik Litkayasa Akuakultur*, 16(1), 57–60.
- Ikbal Syukroni, & Andi Santi. (2021). Profil gizi dan kandungan kolesterol udang windu (*Penaeus monodon*) dengan metode pemasakan berbeda. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 24(3), 319–324. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v24i3.37477>.
- Jamal, M. T., Abdulrahman, I. A., Harbi, M. Al, & Chithambaran, S. (2019). Probiotics as alternative control measures in shrimp aquaculture: A review. *Journal of Applied Biology and Biotechnology*, 7(3), 69–77. <https://doi.org/10.7324/JABB.2019.70313>.
- Kurniawan, L. A., Arief, M., Manan, A., & Nindarwi, D. D. (2019). Pengaruh pemberian probiotik berbeda pada pakan terhadap retensi protein dan retensi lemak udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Journal of Aquaculture and Fish Health*, 6(1), 32. <https://doi.org/10.20473/jafh.v6i1.11272>.
- Lestari, N. A., Aslamyah, S., & Zainuddin. (2019). Composition of body chemistry and glycogenic levels in various dosage of sweet potato (*Ipomea batatas*) as a prebiotic of Lactobacillus sp . in shrimp vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Prosiding Simposium Nasional Kelautan Dan Perikanan VI*, 269–278.
- Li, X., Wang, Y., Li, H., Jiang, X., Ji, L., Liu, T., & Sun, Y. (2021). Chemical and quality evaluation of Pacific white shrimp *Litopenaeus vannamei*: Influence of strains on flesh

- nutrition. *Food Science and Nutrition*, 9(10), 5352–5360. <https://doi.org/10.1002/fsn3.2457>.
- Mariyani, N., & Hendriana, A. (2021). Aplikasi tepung daun kayu manis sebagai suplemen pakan terhadap kualitas daging udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Jurnal Sains Terapan*, 10(2), 30–40. <https://doi.org/10.29244/jstv.10.2.30-40>.
- Masfirotun, A., Redjeki, E. S., & Lutfiah, S. (2021). Uji efisiensi penambahan feed supplement dengan dosis berbeda terhadap retensi protein dan kelangsungan hidup udang vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). *Jurnal Perikanan Pantura (JPP)*, 4(2), 84. <https://doi.org/10.30587/jpp.v4i2.3111>.
- Mustafa, M. F., Bunga, M., Achmad, M., Studi, P., Perairan, B., Perikanan, D., Kelautan, I., & Perikanan, D. (2019). Penggunaan probiotik untuk menekan populasi bakteri vibrio sp. Pada budidaya udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Journal of Fisheries and Marine Science*, 2(2), 69–76.
- Of, E., Different, T., Of, S., On, C., & Quality, W. (2015). *665-Research Results-2574-2-10-20210317 (1)*. 2(1), 1–8.
- Olivia Akaerina, F., Nurhayati, T., & Suwandi, R. (2015). Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Antibakteri dari Bulu Babi. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 18(1), 61–73. <https://doi.org/10.17844/jphpi.2015.18.1.61>.
- Pawenang, E., Syakirin, M. B., & Madusari, B. D. (2022). Pengaruh penambahan probiotik dys symbiotic dengan dosis yang berbeda pada pakan buatan terhadap pertumbuhan udang vannamei (*Lithopenaus vannamei*). *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36(1), 10-18.
- Rahman, R., Lahming, L., & Fadilah, R. (2018). Evaluasi komponen gizi pada pakan udang fermentasi. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, 4(2), 101. <https://doi.org/10.26858/jptp.v4i2.6617>.
- Santoso Umar, W. S. 2020. *Analisa Pangan*. Yogyakarta : UGM Press
- Setyono, B. D. H., Azhar, F., & Paryono, P. (2019). Aplikasi penggunaan bioflock yang dikombinasikan dengan probiotik terhadap performa pertumbuhan udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). *Buletin Veteriner Udayana*, 21, 7. <https://doi.org/10.24843/bulvet.2019.v11.i01.p02>.
- Soedibya, P. H. T., & Pramono, T. B. (2018). *Budidaya perairan tawar* (Issue May 2017).
- Sudarmadji, S. B. (1997). *Prosedur analisa untuk bahan makanan dan pertanian*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudarmadji, S., Suhardi, & Haryono, B. (1989). *Analisa bahan makanan dan pertanian*. Liberty Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada.
- Sudjarwo, G. W., Mahmiah, M, A. W., & C, H. I. (2017). Analisis proksimat dan optimasi pembuatan kitosan dari limbah kulit dan kepala udang whiteleg shrimp (*Litopenaeus vannamei*). *Seminar Nasional Kelautan XII*, 1, 39–44.
- Verdian, A. H., Witoko, P., & Aziz, R. (2021). Komposisi kimia daging udang vanamei dan udang windu dengan sistem budidaya keramba jaring apung. *Jurnal Perikanan Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.25181/peranan.v1i1.1479>.
- Wibowo, E. S., Palupi, E. S., Setiyono, E., Susilo, U., Biologi, F., & Soedirman, U. J. (2023). *Potensi Kandungan Makro Nutrisi Polychaeta Diopatra sp . dari Kawasan Mangrove Jeruklegi Kabupaten Cilacap Sebagai Pakan Udang*. 12(3), 325–330. <https://doi.org/10.14710/buloma.v12i3.53045>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Zainuddin, Z., Aslamyah, S., & Hadijah, H. (2018). Efek dari perbedaan sumber karbohidrat pakan terhadap kualitas air, komposisi proksimat dan kandungan glikogen juvenil udang vannamei *Litopenaeus vannamei* (Boone, 1931). *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*, 2(1), 1-8.



Kajian Kandungan Proksimat Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei) Dari Berbagai Pemberian Probiotik (1).

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | seminar.fpp.undip.ac.id
Internet Source | 2% |
| 2 | ejournal2.undip.ac.id
Internet Source | 1% |
| 3 | ejurnalunsam.id
Internet Source | 1% |
| 4 | Mega Ari Sovani, Lukman Hudi. "The Effect of Sunkist Orange Proportions with Banana and Types of Stabilizing Materials on the Characteristics of Banana Jam", <i>Journal of Tropical Food and Agroindustrial Technology</i> , 2021
Publication | 1% |
| 5 | eprints.unram.ac.id
Internet Source | 1% |
| 6 | online-journal.unja.ac.id
Internet Source | 1% |
| 7 | Faisal Susandi, R. Marwita Sari Putri, Jumsurizal. "Effect of Drying Methods on | 1% |

Physicochemical Characteristics of Stingray (*Dasyatis* sp.) Dried", Marinade, 2020

Publication

8

Abdul Rakhfid, Wa Ode Halida, Rochmady Rochmady, Fendi Fendi. "Probiotic application for growth and survival rate of vaname shrimp *Litopenaeus vannamei* with different density", Akuatikisle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2018

1 %

Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On

Kajian Kandungan Proksimat Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) Dari Berbagai Pemberian Probiotik (1).

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
