

10 Perpustakaan UMSIDA

plagiasi_Qatrun Nada Salsabila_191335300021.pdf

 pet

 K1 AGUSTUS 2024

 Perpustakaan

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:2991847778

Submission Date

Aug 28, 2024, 8:11 AM GMT+7

Download Date

Aug 28, 2024, 8:19 AM GMT+7

File Name

plagiasi_Qatrun Nada Salsabila_191335300021.pdf

File Size

306.4 KB

7 Pages

2,846 Words

17,151 Characters




20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

- 12%  Internet sources
- 18%  Publications
- 1%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 12% Internet sources
- 18% Publications
- 1% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Vidayatul Aziza, Chylen S. Rini, Andika Aliviameita, Jamilatur Rohmah. "Pengaruh ...	11%
<hr/>			
2	Internet	jurnal.yayasanbaktiasih-bdg.co.id	3%
<hr/>			
3	Internet	ojs.unpkediri.ac.id	2%
<hr/>			
4	Internet	ecampus-fip.umj.ac.id	1%
<hr/>			
5	Internet	eprints.ums.ac.id	1%
<hr/>			
6	Internet	journal.universitaspahlawan.ac.id	1%
<hr/>			
7	Internet	halimahkesehatan.blogspot.com	1%
<hr/>			
8	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	1%
<hr/>			
9	Internet	media.neliti.com	1%

Effect of Delaying Urine at Room Temperature and Cold Temperature on the Number of Bacteria in Urinary Tract Infection Patients

Pengaruh Penundaan Urin di Suhu Ruang dan Suhu Dingin Terhadap Jumlah Bakteri Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih

Abstract. *Urinary Tract Infection is an infection of the urinary tract, especially the kidneys, bladder, ureters and urethra which causes various microorganisms, generally bacteria. If urine is left for too long it will affect the validity of the examination results in supporting the diagnosis of an examination, especially UTI. The aim of this study was to determine the effect of delaying urine at room temperature and cold temperature on the number of bacteria in Urinary Tract Infection patients. The method used was Laboratory Experimental with Accidental Sampling sampling techniques in accordance with the inclusion criteria, totaling 5 samples. The results of the study at room temperature (20-25°C) (12.9 /ml). The data were analyzed statistically using the Friedman test, showing a significance value of $P < 0.05$, namely 0.003, that there was an effect of delaying urine at room temperature and at cold temperatures on the number of bacteria in sufferers of Urinary Tract Infections (UTI).*

Keywords - *Urine; The Number Of Bacteria; Urinary tract infection (UTI); Temperature; Length of delay.*

Abstrak. *Infeksi Saluran Kemih adalah infeksi pada saluran kemih, terutama pada ginjal, kandung kemih, ureter dan uretra yang menyebabkan berbagai mikroorganisme, umumnya pada bakteri. Jika urin yang dibiarkan terlalu lama akan mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan dalam menunjang diagnosa suatu pemeriksaan terutama pada ISK. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penundaan urin di suhu ruang dan di suhu dingin terhadap jumlah bakteri pada pasien Infeksi Saluran Kemih. Metode yang digunakan yaitu Eksperimental Laboratorik dengan teknik pengambilan sampel Accidental Sampling sesuai dengan kriteria inklusi yang berjumlah 5 sampel. Hasil penelitian pada suhu ruang (20-25°C) ($12,9 \times 10^4$ CFU/ml), menunjukkan hasil yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan jumlah bakteri pada suhu dingin (2-8°C) ($2,7 \times 10^4$ CFU/ml). Data dianalisis secara statistik menggunakan uji Friedman menunjukkan nilai signifikansi $P < 0,05$ yaitu 0,003 bahwa terdapat pengaruh penundaan urin di suhu ruang dan di suhu dingin terhadap jumlah bakteri pada penderita Infeksi Saluran Kemih (ISK).*

Kata Kunci - *Urine; Jumlah bakteri; Infeksi Saluran Kemih (ISK); Suhu; Lama Penundaan.*

I. PENDAHULUAN

Infeksi Saluran Kemih adalah penyakit simtomatik akibat mikroorganisme di saluran kemih dan kolonisasi bakteri pada saluran kemih. Bakteriuria adalah tanda yang paling penting dari infeksi saluran kemih karena kehadiran bakteri yang signifikan mengacu pada pertumbuhan mikroorganisme hingga ≥ 100.000 cfu/ml dalam kultur urin [1].

Gejala infeksi saluran kemih bervariasi tergantung pada organ yang terkena. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosa ISK pada pasien tanpa gejala memerlukan pemeriksaan urinalisis, pemeriksaan mikrobiologi urin dan pemeriksaan darah [2].

Infeksi saluran kemih atas dan bawah adalah dua kategori utama di mana infeksi saluran kemih terbentuk. Infeksi saluran kemih bagian bawah meliputi infeksi kandung kemih (sistitis), infeksi prostat (prostatitis), dan uretra (uretritis), sedangkan Infeksi saluran kemih bagian atas meliputi infeksi parenkim ginjal (pielonefritis), tubulus ginjal (nefritis intersinialis), dan abses ginjal [3].

ISK dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, yang paling banyak adalah bakteri. Bakteri penyebab ISK biasanya berasal dari flora usus normal dan dapat ditemukan di *introitus vagina*, kulit perineum, *prepusis penis* dan sekitar anus. Penyebab lainnya yang jarang ditemukan adalah jamur dan virus [4]. Menurut [5, 6] Bahwa Infeksi Saluran Kemih (ISK) disebabkan oleh bakteri Gram positif dan Gram negatif. Bakteri Gram positif, termasuk bakteri *Streptococcus* dan *Staphylococcus aureus*, sedangkan pada bakteri Gram negatif seperti *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Pseudomonas*, dan *Proteus* yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya ISK.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan [7], Pada suhu ruang (25-27°C) waktu penyimpanan urin ISK menunjukkan bahwa semakin lama waktu penyimpanan selama 1 jam, jumlah bakteri semakin meningkat dan semakin

lama waktu penyimpanan selama 24 jam pada suhu dingin (2–8°C) jumlah bakteri semakin berkurang dikarenakan pada suhu tersebut dibawah suhu pertumbuhan sehingga bakteri terhambat. Hal ini dikarenakan bakteri akan menyesuaikan diri pada lingkungan barunya yang berlangsung selama 2 jam, sehingga bakteri tersebut belum berkembang biak.

Urine segar yang diperoleh dalam waktu kurang dari 1 jam setelah buang air kecil adalah urin yang baik untuk tes urine. Jika tidak dapat dilakukan pengujian dalam waktu 4 jam disarankan untuk menyimpan urin di lemari es pada suhu antara 2 dan 8 °C. Urin dapat berubah jika disimpan pada suhu kamar untuk waktu yang lama [8].

Di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, sampel urin sering dikirim dalam keadaan tidak segar lagi ke laboratorium, padahal waktu untuk pemeriksaan bakteri dalam urin harus segera dilakukan. Penundaan dalam melakukan pemeriksaan dapat menyebabkan bakteri berkembang biak sehingga pada saat pengambilan koloni yang tumbuh tidak sesuai dengan jumlah bakteri sebenarnya [6].

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2023, di Laboratorium Mikrobiologi RSUD Sidoarjo. Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Sidoarjo telah menyetujui penelitian ini dengan nomor etik 893.3/107/438.5.2.1.1/2023. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental laboratorik menggunakan pendekatan *cross sectional*.

Teknik pada pengambilan sampel ini menggunakan *accidental sampling*, terdiri dari 7 kali pengulangan pada 5 sampel pasien. Desain penelitian ini mencakup tiga kelompok: satu pada suhu normal, satu pada suhu dingin, dan satu sebagai kontrol. Investigasi kultur urin dilakukan pada kelompok kontrol segera (0 jam), dan sampel diperlakukan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam pada suhu kamar (20–25°C) dan selama 2 jam, 4 jam, dan 6 jam pada suhu dingin (2–8°C). Pasien dengan diagnosis dugaan infeksi saluran kemih (ISK), rentang usia rentan 20 hingga 50 tahun, leukosit dalam pemeriksaan sedimen urin lebih besar dari 5 / LPB, bakteri positif, dan pengumpulan urin bagian tengah merupakan kriteria inklusi untuk sampel. (*Mindstream urine*), volume urin ± 30 ml, dan mengisi *Informed consent*.

Alat yang digunakan pada penelitian antara lain cawan petri, tabung reaksi, kaki tiga, kawat kasa, sendok zat, batang pengaduk, botol semprot, *Erlenmeyer*, pipet maat, kawat ose, ose steril disposable, mikropipet, termometer, pipet volume, bulb, rak tabung, beaker glass, gelas ukur, bunsen, *autoclave*, mikroskop, timbangan analitik, incubator, Refrigerator / lemari es, obyek glass, cool box dan pot urine steril.

Pada penelitian ini menggunakan bahan yang digunakan antara lain yaitu media *Mac Conkey Agar (MCA)*, media *Blood Agar Plate (BAP)*, media *Triple Sugar Iron Agar (TSIA)*, Uji *IMVIC (Indol, methyl red, vogesproskur, dan citrate)*, Uji Fermentasi (Glukosa, Laktosa, Sukrosa, Maltosa, dan manosa), Uji semi solid, Kovac's, Alfanaftol, Phenol Red dan KOH, Pewarnaan Gram (kristal violet, lugol, alkohol 70%, safranin), spirtus, minyak imersi, dan aquadest.

Penelitian ini dilakukan dengan cara sampel urine porsi tengah (*Mindstream urin*) yang ditempatkan ke dalam pot urin steril untuk kelompok kontrol (segera) dan kelompok yang telah diberi perlakuan. Selanjutnya, homogenkan spesimen urin dengan membuka bagian tutup pot urine dan celupkan ose steril disposable secara vertikal sampai batas tertentu. Kemudian, inokulasikan sampel tersebut pada media *Agar darah (BAP)* dan *Mac Conkey (MCA)*. Inokulasikan pada media tersebut dengan cara membuat garis tengah pada media agar dari atas hingga bawah lalu goreskan urin secara merata dari bagian atas media pada seluruh permukaan agar. Inkubasi dengan suhu 37°C selama 24–48 jam. Perhitungan bakteri berdasarkan identifikasi jenis bakteri dan perhitungan bakteri yang tumbuh, (*Colony forming unit per ml (CFU/ml)*) [9]. Dan menggunakan uji *Friedman* dengan pengujian data menggunakan software SPSS versi 27.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah pasien laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang timbulnya penyakit. Sekalipun keduanya mempunyai peluang yang sama untuk terkena suatu penyakit, jenis kelamin mempunyai dampak yang signifikan terhadap jenis paparan dan tingkat kerentanan terhadap suatu penyakit [12]. Hal ini disebabkan karena prevalensi Infeksi Saluran Kemih sangat bervariasi berdasarkan jenis kelamin dan usia. Selama kurun waktu penelitian, jumlah pasien Infeksi Saluran Kemih sebanyak 5 orang terdiri dari 2 pasien laki-laki dan 3 pasien perempuan. Persentase pasien ISK berdasarkan kriteria jenis kelamin dan usia.

Tabel 1. Karakteristik Pasien dan Jumlah Pasien

Karakteristik	Jumlah (N)	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	2	40 %
Perempuan	3	60 %
Total	5	100 %
Usia		
20-30	1	20 %
31-40	2	40 %
>40	2	40 %
Total		100 %

Karakteristik yang sesuai dalam kategori jenis kelamin memiliki hasil persentase pada wanita 60% dan pria sebanyak 40%. Pada wanita lebih banyak menderita infeksi saluran kemih dibandingkan dengan pria. Hal ini disebabkan karena perbedaan anatomi fisiologis pada wanita memiliki uretra lebih dekat daripada pria sehingga mudah terinfeksi [13]. Menurut [4] Perempuan memiliki ukuran uretra kurang dari 2 hingga 3 cm, bakteri kontaminasi mudah masuk ke dalam urin. Selain itu, letak saluran kemih perempuan yang dekat dengan vagina sehingga memudahkan masuknya bakteri sedangkan pria memiliki ukuran uretra panjang 15 hingga 18 cm dan berisi cairan prostat yang menghambat infeksi bakteri.

Karakteristik kategori usia dengan persentase jumlah tertinggi pada pasien ISK pada usia 31-40 tahun (40%), pada usia > 40 tahun (40%), dan 20-30 tahun (20%). ISK sering muncul pada orang dewasa usia 20-50 karena usia tersebut merupakan usia produktif karena aktivitas tinggi, bekerja, kurangnya istirahat, stres hingga nutrisi tidak teratur yang dapat menyebabkan lemahnya respons imunitas yang dapat mengganggu pertahanan tubuh yang mengakibatkan seseorang mudah terinfeksi [14]. Penyakit prostat pada pria dan perempuan didefinisikan dengan hormon estrogen post menopause yang sering dikaitkan dengan angka kejadian ISK [15].

ISK dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pendukung (penyakit) yakni inkontensia urin, HIV, DM Tipe II, resisten terhadap antibiotik, kateterisasi urine dan rawat inap sebelumnya. Sampel urine yang terkena ISK pada penelitian ini memiliki ciri-ciri berwarna merah, berbau tajam, keruh atau berdarah, dan ditemukan adanya sedimen leukosit [16].

Jumlah rata-rata bakteri pada urine pasien ISK seperti Tabel 2 memiliki rata-rata perlakuan seperti pada jam ke-0 (Segera) sebanyak $1,8 \times 10^4$ CFU/ml, perlakuan di suhu ruang (20-25°C) pada 2 jam $2,7 \times 10^4$ CFU/ml, 4 jam $3,9 \times 10^4$ CFU/ml, dan 6 jam $12,9 \times 10^4$ CFU/ml. Kemudian untuk perlakuan pada suhu (2-8°C) pada 2 jam $2,2 \times 10^4$ CFU/ml, 4 jam $3,1 \times 10^4$ CFU/ml dan 6 jam $2,7 \times 10^4$ CFU/ml.

Tabel 2. Jumlah Hasil Bakteri Pada Media MCA

Perlakuan suhu (°C)	Waktu (Jam)	Rerata jumlah koloni (CFU/ml) ± Standar Deviasi
Kontrol Ruang (20-25°C)	Kontrol	$1,8 \times 10^4 \pm 15,16$
	2	$2,7 \times 10^4 \pm 16,43$
	4	$3,9 \times 10^4 \pm 15,81$
	6	$12,9 \times 10^4 \pm 202,743$
Dingin (2-8 °C)	2	$2,2 \times 10^4 \pm 21,21$
	4	$3,1 \times 10^4 \pm 122,35$
	6	$2,7 \times 10^4 \pm 8,94$

Jumlah bakteri meningkat pada suhu kamar (20–25°C) setelah terjadi penundaan selama 6 jam. Dikarenakan bakteri mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, yang sesuai dengan kurva pertumbuhan bakteri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri saat ini tumbuh pada fase *eksponensial* yaitu bakteri tumbuh atau berkembang biak serta membelah dengan kecepatan maksimum. Selanjutnya, sel-sel yang baru terbentuk akan berkembang biak dengan kecepatan eksponensial yang stabil [10].

Bakteri akan melewati fase *lag*, yang membutuhkan waktu 2 hingga 4 jam untuk menyelesaikannya, dimana pada fase tersebut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Kemudian pada fase *lag*, bakteri yang beradaptasi dapat dipengaruhi oleh komposisi media, pH, suhu, jumlah sel inokulum awal, dan karakteristik fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah suhu, urin yang normal memiliki suhu (32-38°C) [6]. Suhu berdampak pada metabolisme bakteri, semakin cepat bakteri yang tumbuh maka semakin cepat proses metabolisme dari bakteri tersebut [11].









Jumlah bakteri terjadi penurunan pada urin yang disimpan pada suhu dingin (2-8°C) dengan lama penundaan 6 jam. Hal ini disebabkan pada suhu dingin yang berkisar 2°C sampai dengan 8°C berada dibawah suhu pertumbuhan

minimum. Pertumbuhan bakteri memasuki fase yang sangat rentan terhadap penyimpanan urine pada suhu 2-8°C, dikarenakan semakin lama urin yang disimpan maka semakin banyak bakteri yang mati [7].

Bila suhu tepat untuk pertumbuhan bakteri, bakteri akan mempercepat proses metabolismenya. Bakteri enterik dalam kelompok mesofil, yang memiliki kisaran suhu ideal 20–40 °C, Bakteri yang ditemukan dalam urin peserta penelitian yang telah didiagnosis menderita ISK. Jumlah bakteri yang berkembang biak akan terus meningkat karena kisaran suhu optimal kelompok mesofilik untuk bakteri enterik masih antara 20 dan 25 °C pada suhu ruangan. Selain itu, urin biasanya memiliki kisaran suhu 32 hingga 38 °C, yang mendorong metabolisme bakteri [6].

Berdasarkan uji *Friedman* didapatkan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh penundaan urin di suhu ruang dan suhu dingin terhadap jumlah bakteri pada pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK).

Tabel 3. Identifikasi Jenis Bakteri Pada Media *Mac Conkey* (MCA)

Morfologi koloni					
Jenis Bakteri	Jumlah pasien	Presentase (%)	Warna koloni pada media MCA	Makroskopis koloni	Mikroskopis (100x)
<i>Escherichia coli</i>	2	40 %	Merah muda 	Berbentuk bulat, permukaan cembung, tepi utuh	Gram negatif, Basil 
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	20 %	Putih kehijauan 	Berbentuk bulat, permukaan datar, tepi utuh	Gram negatif, Basil 
<i>Citrobacter</i>	1	20 %	Merah muda 	Berbentuk bulat, permukaan cembung, tepi utuh dan berlendir	Gram negatif, Basil 
<i>Enterobacter aerogenes</i>	1	20 %	Merah muda 	Berbentuk bulat, tepi utuh, permukaan cembung dan berlendir	Gram negatif, Basil 

Pada Tabel 3, bakteri yang diidentifikasi sebagai Bakteri *Escherichia coli* mampu memfermentasikan laktosa, dan menghasilkan warna merah muda pada media *Mac Conkey Agar* (MCA). Selain itu, pada media *Blood Agar Plate* (BAP), bakteri ini dapat menghasilkan hemosilin, yang merupakan satu-satunya protein yang dapat melisis eritrosit, khususnya hemolisa β (hemolysis total). [17]. Bentuknya bundar, permukaannya cembung, dan tepinya tidak terputus jika dilihat secara detail makroskopis. Kemudian, dengan pembesaran 100x, pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa zat tersebut berbentuk basil, berwarna merah, dan Gram negatif. menunjukkan hasil positif (+) pada uji *Triple Sugar Iron Agar* (TSIA) lereng berwarna kuning (Acid), dasar berwarna kuning (Acid), negatif H₂S, positif (gas) dan pada uji indol, uji *Methyl Red* (MR), uji semi solid dan uji fermentasi karbohidrat atau gula-gula (glukosa, sukrosa, laktosa, manosa, dan maltosa) menunjukkan hasil positif (+), sedangkan dari uji *Voges-Proskauer* (VP) dan uji simon sitrat menunjukkan hasil negatif (-). *Escherichia coli* yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih biasa disebut *Uropatogenik Escherichia coli* (UPEC). bakteri batang gram negatif UPEC berasal dari sistem pencernaan yang menuju ke vagina dan periuretra, uretra, kandung kemih, bahkan ke ginjal [18].

Pseudomonas bakteri yang termasuk dalam kelompok ini tidak mampu memfermentasi laktosa, yang ditandai dengan berubahnya media menjadi kuning.. Hasil identifikasi bakteri *Pseudomonas aeruginosa* pada media *Mac Conkey Agar* (MCA) menunjukkan bakteri berwarna putih kekuningan dan pada media *Blood Agar Plate* (BAP) memiliki warna putih susu dengan pengamatan makroskopis koloni berbentuk bulat, permukaan datar, tepi utuh. Pada pemeriksaan mikroskopis dengan perbesaran 100x menunjukkan bakteri Gram negatif berwarna merah.

