

# 161040700004

*by* Prodi Agroteknologi

---

**Submission date:** 18-Apr-2023 10:38AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2067966623

**File name:** ARTIKEL\_SAWI\_PUTIH\_isna\_1.docx (333.95K)

**Word count:** 2789

**Character count:** 16814



---

**Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Lamtoro Terhadap Pertumbuhan  
dan Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica Pekinensia L.*)**

**CHAIRIL ISNA MASRUOH**

**161040700004**

Dosen Pembimbing

M. Abror SP., MM.

Dosen Penguji

Intan Rochmah Nurmalasari, SP MP

Ir. Saiful Arifin, MM.

**Program Studi Agroteknologi**

**Fakultas Sains Dan Teknologi**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

**Januari, 2023**


**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Lamtoro Terhadap  
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica  
Pekinensia L.*)

Nama Mahasiswa : CHAIRIL ISNA MASRUOH  
NIM : 161040700004

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
(M. Abror SP., MM.)  
Dosen Penguji 1  
(Intan Rochmah Nurmalasari, SP MP)  
Dosen Penguji 2  
(Ir. Saiful Arifin, MM.)



Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
(M. Abror SP., MM.)  
NIP/NIK. 204261  
Dekan  
(Dr. Hindarto, S. Kom, MT)  
NIP/NIK. 201562 / 197307302005011002



Tanggal Ujian

Tanggal Lulus

## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
I PENDAHULUAN .....	1
II METODE PENELITIAN .....	7
III HASIL PEMBAHASAN .....	8

## **SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : CHAIRIL ISNA MASRUOH

NIM : 161040700004

Program Studi : Agroteknologi

Fakultas : Sains Dan Teknologi

**DAN**

Dosen Pembimbing : M. Abror.,SP., MM.

NIK/NIP : 204261

Program Studi : Agroteknologi

Fakultas : Sains Dan Teknologi

**MENYATAKAN** bahwa, karya tulis ilmiah dengan rincian:

Judul : Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Lamtoro Terhadap  
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Putih (Brassica  
Pekinensia L.)

Kata Kunci : Sawi putih,Pupuk Organik Cair Lamtoro.

**1**

**TELAH:**

1. Disesuaikan dengan petunjuk penulisan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMSIDA tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.
2. Lolos uji cek kesamaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

**SERTA\*:**

- **Bertanggung jawab untuk** melakukan publikasi karya tulis ilmiah tersebut ke jurnal ilmiah/prosiding sesuai ketentuan Surat Keputusan Rektor UMSIDA tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Khususnya Lampiran Huruf B.
- **Menyerahkan tanggung jawab untuk** melakukan publikasi karya tulis ilmiah tersebut ke jurnal ilmiah/prosiding sesuai ketentuan Surat Keputusan Rektor UMSIDA tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Khususnya Lampiran Huruf B kepada Bidang Pengembangan Publikasi Ilmiah DRPM UMSIDA.

Demikian pernyataan dari saya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Menyetujui, Sidoarjo, (19/02/2023)

Dosen Pembimbing Mahasiswa

(M. Abror, SP, MM)

NIP/NIK. 204261

(CHAIRIL ISNA MASRUOH)

161040700004

**1**

\*Centang salah satu.

**PERNYATAAN MENGENAI KARYA TULIS ILMIAH DAN SUMBER INFORMASI  
SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah tugas akhir saya dengan judul “Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Lamtoro Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica Pekinensia* L.)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir karya tulis ilmiah tugas akhir saya ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Sidoarjo, Januari 2023

CHAIRIL ISNA MASRUOH

161040700004

**Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Lamtoro Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica Pekinensia* L.)**

CHAIRIL ISNA MASRUROH

<sup>1</sup>Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**ABSTRAK**

Tanaman sawi putih adalah sayuran daun yang banyak diminati oleh konsumen Indonesia karena memiliki kandungan pro vitamin A, asam askorbat, dan serat yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair lamtoro terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi putih. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Modong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pengamatan lanjutan akan dilakukan di Laboratorium prodi Agroteknologi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2022. Data analisis menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan 7 perlakuan yaitu P0: kontrol, P1: 5ml/L, P2: 10ml/L, P3: 15 ml/L, P4: 20ml/L, P5: 25ml/L, P6: 30ml/L dan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 21 satuan percobaan dan dilanjut dengan uji BJK 5%. Variable yang diamati diantaranya tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, berat basah, berat kering dan indeks panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair lamtoro dengan dosis tertinggi yaitu 30 ml/L memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun pada tanaman sawi putih tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap beberapa parameter pengamatan seperti panjang akar, berat basah, berat kering dan indeks panen.

Kata kunci : Sawi putih, Pupuk Organik Cair Lamtoro

## **PENDAHULUAN**

Tanaman sawi putih adalah sayuran daun yang banyak diminati oleh konsumen Indonesia karena memiliki kandungan pro vitamin A, asam askorbat, dan serat yang tinggi. Masa panen yang singkat dan pasar yang terbuka luas, menjadi daya tarik untuk budidaya sawi putih. Daya tarik lainnya adalah harga yang relatif stabil dan mudah dibudidayakan oleh petani. (Putri & Respatijarti, 2019). Sawi putih merupakan jenis tanaman hortikultura banyak disukai masyarakat karena rasanya paling enak dibandingkan jenis sawi yang lain. Setiap 100 g bahan segar sawi mengandung 2,3 g protein, 4,0 g karbohidrat, 0,3 g lemak, 220 mg Ca, 38 mg P, 2,9 mg Fe, 1.940 mg vitamin A, 0,09 mg vitamin C.

Salah satu proses yang penting dalam budidaya tanaman yaitu pemupukan. Pemupukan adalah usaha pemberian pupuk untuk menambah unsur hara ke dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, produksi dan kualitas tanaman. Pertumbuhan tanaman dapat optimal jika tanaman memperoleh unsur hara yang tersedia dalam jumlah dan bentuk yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Petani umumnya terbiasa menggunakan pupuk anorganik secara terus menerus tanpa diimbangi penggunaan pupuk organik tentunya akan berdampak buruk bagi kondisi hara tanah, tanah yang sering diberi pupuk anorganik lama kelamaan akan menjadi keras sehingga sulit untuk diolah dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Salah satu cara untuk menjaga kualitas tanah yaitu dengan mensubstitusi penggunaan pupuk anorganik dengan mengembangkan pupuk organik yang ramah lingkungan. (Hasan et al., 2021)

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sampah dapur, daun kering, ranting, akar dan bagian tumbuhan lainnya, kotoran hewan serta bahan lainnya yang bersifat alam. Berdasarkan bentuknya pupuk organik dibagi menjadi 2, yaitu pupuk padat dan cair. Pupuk organik adalah hasil pembusukan bahan-bahan organik yang di dalamnya terkandung lebih dari satu unsur hara yang mudah diserap oleh tanaman. Pupuk organik cair dapat digunakan dengan cara disiram ke tanaman atau disemprotkan pada daun dan batang tanaman. (Redi Setiawan, Prima Novia, 2021)



Adapun alternatif bahan pembuatan pupuk organik cair yaitu dengan menggunakan bahan baku alami yang mengandung unsur nitrogen, salah satunya daun lamtoro (*Leucaena leucocephala* L.). Daun lamtoro yang biasanya hanya diambil untuk pakan ternak ternyata memiliki kelebihan atau fungsi yang lain karena memiliki unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kandungan unsur hara makro pada daun lamtoro yaitu 3,84 % Nitrogen ; 0,22 % Posfor ; 2,06 % Kalium; 1,31% Kalsium; dan 0,33% Magnesium; 0,51% SO<sub>4</sub>. Sedangkan unsur hara mikro yang terdiri atas 191 ppm Mn, 171 ppm Fe, 33 ppm Zn, dan 15 ppm Cu. Oleh karena itu, banyaknya unsur hara yang terkandung dalam daun lamtoro sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair lamtoro terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi putih.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Modong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pengamatan lanjutan akan dilakukan di Laboratorium prodi Agroteknologi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2022. Adapun alat yang menunjang pada penelitian ini diantaranya polybag, cangkul, kamera, alat tulis, sabit, penggaris, millimeter blok, gelas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sawi putih, air bersih, pestisida, pupuk kandang, poc lamtoro.

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini pada menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) secara tunggal, yang terdiri dari 7 perlakuan yaitu : P<sub>0</sub> : control (0 ml/L), P<sub>1</sub>: pemupukan konsentrasi (5ml/L), P<sub>2</sub>: pemupukan konsentrasi (10ml/L), P<sub>3</sub>: pemupukan konsentrasi (15ml/L), P<sub>4</sub>: pemupukan konsentrasi (20ml/L), P<sub>5</sub>: pemupukan konsentrasi (25ml/L) P<sub>6</sub>: pemupukan konsentrasi (30ml/L).

Terdapat 7 perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali, sehingga didapatkan 21 satuan percobaan dengan 4 tanaman/perlakuan total keseluruhan 84 tanaman.

Pelaksanaan Penelitian dengan diawali dengan Pembuatan poc lamtoro, Pembuatan POC Lamtoro bahan yang digunakan dalam membuatnya sebagai berikut daun lamtoro, air, air lerih, tetes tebu, dan EM4. Pada pembuatan poc lamtoro 5kg, dibutuhkan air bersih 4 liter, air lerih 1,6 liter, tetes tebu 400ml dan EM4 400ml. Bahan-bahan dicampur semua setelah daun lamtoro ditumbuk, kemudian ditutup rapat setiap hari di buka dan di aduk.

Persiapan media tanam yang disiapkan yaitu pupuk kandang kambing, tanah, dan polybag ukuran 25. Penyemaian dilakukan seminggu sebelum proses tanam, penyemaian berguna untuk mengetahui bibit unggul tanaman. Sekitar 2 hari tanaman sawi putih sudah berkecambah, dalam proses penyemaian penyiraman dilakukan sehari sekali pada pagi hari ataupun sore hari. Penanaman sawi putih dapat dilakukan apabila kriteria sawi memiliki daun 2-4 helai, penanaman dilakukan pada 7 HSS (Hari Setelah Semai). Pemeliharaan pada tanaman sawi putih sebagai berikut penyiraman, penyiangan, pemupukan serta pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Pemanenan dilakukan pada umur 40 HST (Hari Setelah Tanam) dengan ciri-ciri tanaman sawi mencapai umur panen berdasarkan varietas yang ditanam, krop sudah berbentuk penuh dan padat. Cara pemanenan adalah dengan memotong batangnya tepat dibawah krop dengan menggunakan pisau.

Variabel pengamatan penelitian ini diantaranya: tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), panjang akar (cm), berat basah (gr), berat kering (gr), indeks panen Analisis Data. Dari data diatas dapat dilakukan dengan analisis ragam, apabila hasilnya nyata atau sangat nyata akan dilanjut uji BNJ.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinggi tanaman**

Hasil Analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik daun lamtoro memberikan pengaruh terhadap parameter tinggi tanaman pada semua umur

pengamatan. Apabila terdapat perbedaan perlakuan maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) 5% dan 1%.

Tabel 1 Rata-rata Tinggi Tanaman (cm) sawi putih pada Pemberian POC lamtoro pada Berbagai Umur Pengamatan

Perlakuan	7 HST	14 HST	21 HST	28 HST
P0	5.57 a	10.53 a	14.47 a	21.37 a
P2	5.90 a	11.37 a	14.57 a	21.93 a
P6	6.10 a	11.63 a	15.53 a	22.13 a
P4	6.33 a	11.80 a	15.67 a	22.80 a
P3	6.63 a	11.90 a	15.70 a	23.10 a
P5	6.63 a	12.10 a	15.87 a	23.53 a
P1	7.43 a	13.07 a	17.27 a	24.73 a
BNJ 5%	2.45	6.57	8.25	19.26

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata

Dari hasil uji analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat respon yang sangat nyata pemberian POC lamtoro terhadap variabel tinggi tanaman. Setelah dilakukan uji BNJ 5%. Hal ini diduga terjadi karena poc lamtoro lebih mampu mendukung pertumbuhan tanaman sawi putih secara terus menerus walaupun telah memasuki masa generatif, sehingga tanaman membutuhkan konsentrasi nutrisi yang lebih tinggi untuk mendukung fase vegetatif dan generative. (Utami Nugraha & Dinurrohman Susila, 2015) angka dengan huruf yang tidak sama pada perlakuan dan variabel yang sama menyatakan berbeda sangat nyata dengan uji BNT 5%

#### **Jumlah daun**

Respon tanaman sawi putih terhadap konsentrasi POC pada pengamatan jumlah daun per perlakuan sawi putih berpengaruh sangat nyata pada umur 21 HST. Jumlah daun per perlakuan sawi putih yang disajikan pada Tabel 2 dengan pemberian konsentrasi nutrisi 30 ml (P6) lebih banyak dibandingkan dengan pemberian konsentrasi nutrisi 5 ml (P1).

Tabel 2 Rata-rata Jumlah daun sawi putih pada Pemberian POC lamtoro pada Berbagai Umur Pengamatan

Perlakuan	7 HST	14 HST	21 HST	28 HST
P0	3.67	4.00	4.33	4.67
P2	3.67	4.33	4.67	5.33
P6	3.33	4.33	5.00	5.67
P4	3.67	4.33	5.33	6.00
P3	3.67	4.33	5.33	6.00
P5	3.67	4.33	5.33	6.00
P1	3.67	4.67	5.33	6.00
BNJ 5%	tn	tn	tn	tn

Keterangan : tn = tidak nyata

Dari hasil uji analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat respon yang sangat nyata pemberian POC lamtoro terhadap variabel jumlah daun . Setelah dilakukan uji BNJ 5% maka data selengkapnya di sajikan pada Tabel 2.angka dengan huruf yang tidak sama pada perlakuan dan variabel yang sama menyatakan berbeda sangat nyata dengan uji BNT 5%.Berdasarkan Tabel 2 diatas terlihat pada bahwa rata-rata jumlah daun pada umur 14 hst diperoleh data tertinggi P6 pada perlakuan pemberian nutrisi 30 ml.

### **Panjang Akar**

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair lamtoro tidak berpengaruh pada pengamatan panjang akar

Tabel 3 Pengaruh konsentrasi POC lamtoro terhadap panjang akar

Perlakuan	Rata-Rata Panjang
P0 ( 0 ml)	3,61
P1 (5 ml)	4,07
P2 (10 ml)	3,08
P3 (15 ml)	3,02
P4 (20 ml)	3,25
P5 (25 ml)	1,86
P6 (30 ml)	1,38
BNJ 5%	tn

Keterangan: tn = tidak nyata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pupuk organik (daun lamtoro) dalam berbagai konsentrasi terhadap pertumbuhan tanaman sawi. Dari analisis parameter pengamatan panjang akar tidak berpengaruh nyata pada tanaman sawi putih (table 2). Hal tersebut dapat terlihat pada rata-rata panjang akar tanaman dari P0, P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Peningkatan unsur P dapat merangsang pertumbuhan akar, oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan panjang akar pada tanaman dapat dilakukan dengan pemberian unsur P sesuai kebutuhan pada tanaman sawi. Selain unsur N, unsur P juga berperan penting dalam pertumbuhan tanaman yang dimana berfungsi sebagai pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik. Dimana dalam pertumbuhannya dapat meningkatkan jaringan tanaman yang membentuk titik tumbuh tanaman serta pembentukan bunga maupun pematangan buah/biji, sehingga dapat mempercepat masa pemanenan.

### **Berat Basah**

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair lamtoro tidak berpengaruh pada pengamatan berat basah

Tabel 4 Pengaruh konsentrasi POC lamtoro terhadap berat basah

Perlakuan	Rata-Rata Berat Basah (gr)
PO ( 0 ml)	11,80
P1 (5 ml)	12,50
P2 (10 ml)	6,67
P3 (15 ml)	25,00
P4 (20 ml)	23,50
P5 (25 ml)	17,77
P6 (30 ml)	25,93
BNJ 5%	tn

Keterangan tn : tidak nyata

Perlakuan konsentrasi pupuk organik cair lamtoro menunjukkan bahwa tidak berpengaruh nyata terhadap berat basah tanaman sawi putih (tabel 3) Sehingga dalam hal ini dapat dilakukan peningkatan melalui pemberian konsentrasi poc lamtoro. Hal ini disebabkan karena konsentrasi pemupukan rendah, karena pemupukan dengan menggunakan poc apabila pemberian semakin tinggi maka hasil tanaman juga meningkat.

Sedangkan menurut (Hidayat & Suharyana, 2019) menyatakan bahwa keseluruhan unsure yang diserap oleh tanaman dapat mempengaruhi satu sama lain, sehingga pemupukan dengan menggunakan pupuk organik caik lamtoro dapat membantu pertumbuhan pada tanaman. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan hasil produksi dapat dilakukan dengan penambahan konsentrasi unsur hara tinggi akan nitrogen (N) pada tanaman.

### **Berat kering (gram)**

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair lamtoro tidak berpengaruh pada pengamatan berat kering

Tabel 5. Pengaruh konsentrasi POC lamtoro terhadap berat basah

Perlakuan	Rata-rata
P0	3,61
P1	4,07
P2	3,08
P3	3,02
P4	3,25
P5	1,86
P6	1,38
BNJ	tn

Keterangan tn : tidak nyata

Berat kering menunjukkan jumlah biomassa yang dapat diserap oleh tanaman. Berat kering tanaman adalah hasil penimbunan hasil bersih asimilasi CO<sub>2</sub> yang dilakukan selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada pertumbuhan tanaman itu sendiri dianggap sebagai peningkatan berat segar dan penimbunan bahan kering. Jadi semakin baik pertumbuhan tanaman maka berat keringnya meningkat. Hasil perlakuan pupuk organik cair lamtoro dengan berbagai dosis memberikan pengaruh tidak nyata terhadap bobot kering tajuk. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian Pupuk organik cair lamtoro memperlihatkan pengaruh interaksi yang tidak nyata pada komponen berat kering total pada tanaman sawi putih, sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjut BNJ.

Berat tanaman mencerminkan bertambahnya protoplasma, hal ini disebabkan ukuran dan jumlah selnya bertambah. Pertumbuhan protoplasma berlangsung melalui peristiwa metabolisme dimana air, karbon dioksida dan garam-garam anorganik diubah menjadi cadangan makanan dengan adanya proses fotosintesis. mengemukakan, bahwa ketersediaan unsur hara yang cukup dalam pertumbuhan tanaman akan memungkinkan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi semaksimal mungkin. (Elsafiana et al., 2017)

### **Indeks Panen**

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik cair lamtoro tidak berpengaruh pada pengamatan indeks panen

Tabel 6. Pengaruh konsentrasi POC lamtoro terhadap indeks panen

Perlakuan	Rata-Rata Indeks Panen (gr)
P0 ( 0 ml)	0,80
P1 (5 ml)	0,90
P2 (10 ml)	0,82
P3 (15 ml)	0,90
P4 (20 ml)	0,82
P5 (25 ml)	0,76
P6 (30 ml)	0,68
BNJ 5%	tn

Keterangan: tn =tidak nyata

### **KESIMPULAN**

1. Perlakuan pemberian pupuk organik cair lamtoro dengan dosis tertinggi yaitu 30 ml/L memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun pada tanaman sawi putih.
2. Pemberian pupuk organik cair lamtoro berbagai dosis tidak berpengaruh nyata terhadap beberapa parameter pengamatan seperti panjang akar, berat basah, berat kering dan indeks panen.



## DAFTAR PUSTAKA

- Elsafiana, E. (Elsafiana), Mahfudz, M. (Mahfudz), & Wahyudi, I. (Imam). (2017). Respon Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica Pekinensis* L.) Terhadap Pemberian Berbagai Dosis Pupuk Kandang Sapi. *Agrotekbis*, 5(4), 250238. <https://www.neliti.com/id/publications/250238/>
- Hasan, F., Nur, M. J., & Nayo, F. (2021). Aplikasi pupuk organik cair daun lamtoro (*Leucaena leucophala* (Lam. de Wit) on growth and yield of sweet corn (*Zea mays saccharata* sturt L.). *Jurnal Agercolere*, 3(2), 38–45. <https://doi.org/10.37195/jac.v3i2.129>
- Hidayat, O., & Suharyana, A. (2019). Pengaruh Dosis Pupuk Organik Cair Daun Lamtoro terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa* l.) Varietas Nauli-F1. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 7(2), 57. <https://doi.org/10.35138/paspalum.v7i2.118>
- Putri, A. M., & Respatijarti. (2019). Uji Daya Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica rapa* L.Ssp. *pekinensis*) di Dataran Tinggi. *Jurnal Produksi Tanaman*, 7(3), 474–479.
- Redi Setiawan, Prima Novia, B. B. (2021). *the Effect of Concentration Lamtoro Liquid Organic*. 5(2), 100–109.
- Elsafiana, E. (Elsafiana), Mahfudz, M. (Mahfudz), & Wahyudi, I. (Imam). (2017). Respon Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica Pekinensis* L.) Terhadap Pemberian Berbagai Dosis Pupuk Kandang Sapi. *Agrotekbis*, 5(4), 250238. <https://www.neliti.com/id/publications/250238/>
- Hasan, F., Nur, M. J., & Nayo, F. (2021). Aplikasi pupuk organik cair daun lamtoro (*Leucaena leucophala* (Lam. de Wit) on growth and yield of sweet corn (*Zea mays saccharata* sturt L.). *Jurnal Agercolere*, 3(2), 38–45. <https://doi.org/10.37195/jac.v3i2.129>
- Hidayat, O., & Suharyana, A. (2019). Pengaruh Dosis Pupuk Organik Cair Daun Lamtoro terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa* l.) Varietas Nauli-F1. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 7(2), 57.

<https://doi.org/10.35138/paspalum.v7i2.118>

Putri, A. M., & Respatijarti. (2019). Uji Daya Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica rapa* L.Ssp. *pekinensis*) di Dataran Tinggi. *Jurnal Produksi Tanaman*, 7(3), 474–479.

Redi Setiawan, Prima Novia, B. B. (2021). *the Effect of Concentration Lamtoro Liquid Organic*. 5(2), 100–109.

161040700004

---

ORIGINALITY REPORT

---

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1

archive.umsida.ac.id

Internet Source

9%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography On