

NO.RM

:

NAMA

:

(L/P)

TGL LAHIR / UMUM

:

TEMPAT STIKER IDENTITAS

LAPORAN OPERASI

DPJP Bedah :	Operator:	Asisten Operator :	Instrumentir:
DPJP Anestesi :	Perawat Anestesi :	Tgl Pembedahan :	
Diagnosa Pra Bedah :			
Diagnosa Pasca Bedah :			
Tindakan Operasi :			
1.			
2.			
Jenis Operasi *)		Kode Billing :	
☐ Kecil ☐ Sedang ☐ Besar ☐ Khusus		Anestesi *)	
Sifat Operasi *)		☐ General ☐ Regional ☐ Local	
☐ Cito ☐ Urgen ☐ Elektif ☐ ODC			
Operasi mulai : Jam	Operasi selesai : Jam	Lama operasi :	
Pembiusan mulai : Jam	Pembiusan selesai : Jam	Lama pembiusan :	
Jenis Pembedahan ☐ Bersih ☐ Bersih Terkontaminasi ☐ Terkontaminasi ☐ Kotor			
Operasi ke ☐ 1 (satu) ☐ Ulangan			
URAIAN OPERASI :			
1. Mencuci Tangan			
2. Posisi pasien terlentang dan kepala diganjal bantal kecil setinggi 12cm			
3. Pilih ukuran pipa endotrakeal yang akan digunakan, lalu periksa balon pipa / cuff dengan mengembangkan dengan udara 10cc serta pasang blade yang sesuai			
4. Oksigenasi dengan bag dan mask / ambu bag dengan O2 100% minimal 30 detik			
5. Masukkan obat-obatan sedasi dan muscle relaxan			
6. Buka mulut dengan cara cross finger dan tangan kiri memegang laryngoscope			
7. Masukkab bilah laryngoscope dengan lembut menelusuri mulut sebelah kanan, sisihkan lidah ke kiri			
8. Masukkan bilah sedikti demi sedikit sampai ujung laryngoscope mencapai dasar lidah, perhatikan agar lidah atau bibir tidak terjepit diantara bilah dan gigi pasien.			
9. Angkat laryngoscope keatas dan kedepan dengan kemiringan 30-40 derajat sejajar dengan aksis pegangan, jangan sampai menggunakan gigi sebagai titik tumpu.			
10. Masukkan endotrakeal dari sisi kanan mulut ke faring sampai bagian proximal dari cuff endotrakeal tube melewati pita suara 1-2 cm atau pada orang dewasa kedalaman endotrakeal tube 19-23cm. Waktu intubasi boleh lebih dari 30 detik.			
11. Cek apakah endotrakeal sudah benar posisinya. Hubungkan pipa ETT dengan ambubag.			
12. Setelah bunyi napas optimal dicapai, isi cuff dengan udara 5-10cc, sampai kebocoran mulai tidak terdengar			
13. Lakukan fiksasi dengan plester, pasang orofaring, untuk mencegah pasien mengigit pipa ett			
Bila perlu bersambung di halaman selanjutnya			

Langkah Uraian Operasi :		
Komplikasi selama pembedahan : (bila ada)		
Konsultasi Intra-Operatif		
Jumlah Perdarahan : cc		
Jenis & Jumlah Darah Masuk : ☐ PRC : cc ☐ FFP : cc ☐ ... : cc ☐ WB : cc ☐ TC : cc		
Merk : Nama implant : Stiker / Nomor Register implant Nama pendamping Implant : (Bila ada)		
Specimen / jaringan dikirim ke : ☐ PA ☐ Laborat ☐ Microbiology ☐ Tidak perlu		Keterangan Jaringan : 1. 2. 3.
Tanda Tangan DPJP dr.....Sp.		Tanda Tangan Operator dr.....